

Esporga en verd i gestió de la vegetació

- ▶ Supressió o treta de rebrots
- ▶ Supressió de brots dobles o bessons
- ▶ Despuntat
- ▶ Treta de cavalls "escavallar"
- ▶ Supressió de pàmpols "despampolat"
- ▶ Aclarida de raïms

La poda en verd és un conjunt d'operacions tendents a afavorir la lluita preventiva contra possibles malalties, ja que eviten la creació de microclimes al voltant del raïm facilitant el seu aireig i assolellat. Així s'aconsegueix una maduració més òptima, es facilita la millor localització dels tractaments sanitaris al raïm, es millora el rendiment de la verema manual i la netedat de la verema mecànica i es facilita la poda hivernal de l'any proper. L'esporga en verd és també una operació indispensable per la correcta formació dels ceps.


Les operacions d'esporga en verd varien força segons les comarques o zones vitícoles, les varietats de viníferes, la fertilitat dels sòls i els microclimes locals. També varia en alguns casos el seu nom i dates de realització.

Supressió o treta de rebrots



Consisteix en suprimir totes les brotacions sortides tant del portaempelt com de la soca i braços de la vinífera. Aquesta supressió es realitzarà quan els rebrots encara siguin tendres. Si els primers anys de la plantació es suprimeixen correctament les brotacions del portaempelt s'aconsegueix que desapareguin quasi totalment, de tal manera

que es facilita el posterior treball mecànic del llom i s'evita el risc de fitotoxicitat en l'aplicació d'herbicides. Cal eliminar els rebrots des de la base de la soca, deixant només els més ben situats quan es vulgui substituir braços envellits del cep.



Supressió de brots dobles o bessons

▼ L'eliminació dels brots dobles o bessons sortits dels borrons basals de les brocades es realitzarà quan els brots són encara tendres i tenen menys de 25cm de longitud. Al deixar un sol brot per cada borró es facilita un millor aireig i assolellat de l'interior del cep, evitant la creació d'un microclima humit entorn el raïm. La supressió de brots dobles també facilita la verema i la localització dels tractaments dirigits als raïms.

Despuntat

▼ La supressió de l'extrem dels brots o sarments tendres del cep facilita el pas de maquinària sense danyar el cep i permet millorar el rendiment i qualitat de la verema mecànica. El nivell de despuntat ha de ser el mínim possible per aconseguir els objectius desitjats. Els despuntats per afavorir el granat es realitzaran 5 o 6 dies abans de l'inici de la floració, mentre que els despuntats per facilitar el trànsit de maquinària es realitzaran o abans de parar el creixement del sarment o el més a prop possible de la verema.

El retallat excessiu o en dies o períodes de molt elevades temperatures pot originar cremades al raïm. D'altra banda, no és convenient realitzar ensofrades immediatament després del retallat de la vegetació, ja que pot incrementar el risc de cremades al raïm.

Treta de cavalls "escavallar"

▼ La supressió dels "cavalls" o brots axil·lars de la part inferior del sarment (generalment els situats per sota del raïm superior), s'ha de realitzar quan els cavalls encara són tendres i tenen uns 10cm. L'escavallat facilita la localització dels tractaments dirigits al raïm, redueix el risc de mildiu tardà, facilita la verema manual i permet augmentar la qualitat i disminuir les pèrdues en la verema mecànica.

En varietats i zones amb molt risc de Botrytis es recomana escavallar fins el cavall superior a l'últim raïm. En varietats amb risc de cremades al raïm, només s'han de suprimir els cavalls per sota del raïm. En viticultura ecològica, es recomana aplicar la màxima supressió de "cavalls" per prevenir atacs de Botrytis Cinerea.






Comparació aspecte caps mateixa vinya de Macabeu de no esporgat i esporgat, juny 2007. Foto: LL Serra



Supressió de pàmpols “despampolat”

▼ És la supressió d'alguns pàmpols de la base del sarment per tal de facilitar l'aireig i assolellat del raïm i facilitar-ne els tractaments. El despampolat també és útil per facilitar la verema manual i millorar el rendiment i la qualitat de la verema mecànica. La intensitat del despampolat dependrà del risc de Botrytis, de cremat del raïm i d'atacs de “podridura àcida”. En varietats i zones sensibles a la Botrytis Cinerea es recomana suprimir fins el pàmpol oposat a l'últim raïm, mentre que en aquelles on hi ha risc de cremades només es suprimiran els pàmpols de sota del raïm més baix. En el cas de varietats sensibles a la podridura àcida i en viticultura ecològica es recomana aplicar també la màxima supressió de pàmpols.



Aclarida de raïms




La supressió d'una part dels raïms del cep permet millorar els paràmetres qualitatius de la verema i l'equilibri vegetatiu del cep. També facilita la recuperació de ceps debilitats per inclemències climàtiques o per sobreproducció en anys anteriors. La supressió pot variar entre un 20% i un 40% dels raïms en funció del nivell qualitatiu previsible per la varietat i la zona d'acord amb el del destí de la producció. Es suprimiran preferentment primer els raïms de les brotacions de l'extrem dels braços començant pel raïm superior, tenint cura d'igualar el nombre de raïms per sarment. De forma genèrica, en les varietats negres l'aclarida es realitzarà a l'inici de l'enverat i en les blanques abans del tancat del raïm. Cal moderar el nivell d'aclarit en varietats amb risc de Botrytis Cinerea ja que el raïm que queda al cep incrementa el seu pes i té un major risc d'atac.




Aclarida 40% de raïms de Macabeu, juliol 2007. Foto: Ll. Serra



Supressió o treta de rebrots



Supressió de brots dobles o bessons



Despuntat

